

مبادئ توجيهية لمختلف اللقاحات أثناء الحمل

لا يوجد أي دليل للمخاطر التي يتعرض لها الجنين أثناء تلقيح المرأة الحامل سواء كان اللقاح غير نشط لفيروس أو بكتيرية أو توكسين. أما اللقاحات الحية التي تعطى للمرأة الحامل فتشكل خطراً على الجنين ، وبالتالي يمنع أخذها خلال فترة الحمل "ان فوائد تلقيح النساء الحوامل عادة ما تفوق المخاطر المحتملة خاصة اذا كان احتمال التعرض للمرض عالٍ ، فالإصابة من شأنها أن تشكل خطراً على الأم أو الجنين، بينما اللقاح من غير المرجح أن يسبب ضرراً".

اللقاحات التي يوصى بها بشكل روتيني

التوصيات العامة لاستخدامه لدى النساء الحوامل	اللقاح
يمكن استخدامه بحال كانت الفوائد تفوق المخاطر	Hepatitis A التهاب الكبد ألف
يوصى به في بعض الحالات	Hepatitis B التهاب الكبد ب
لا يوصى به	Human Papillomavirus فيروس الورم الحليمي البشري
يوصى به	Influenza Inactivated الأنفلونزا غير النشط
يمنع استخدامه	LAIV–Influenza الأنفلونزا النشط
يمنع استخدامه	الحصبة - الكزاز - الحصبة الألمانية Measles, Mumps, Rubella - MMR
عدم كفاية البيانات لتوصية محددة	Meningococcal Conjugate MCV4- السحايا
عدم كفاية البيانات لتوصية محددة	Pneumococcal Conjugate PCV13 المكورات الرئوية
عدم كفاية البيانات لتوصية محددة	Pneumococcal Polysaccharide PPSV23 المكورات الرئوية
يمكن استخدامه اذا دعت الحاجة	Polio PV شلل الأطفال
ينبغي ان يستخدم عند الحاجة	Td- Tetanus and Diphtheria الكزاز والدفتيريا
موصى به	الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي Tdap- Tetanus, Diphtheria, and Pertussis
يمنع استخدامه	الجدري Varicella
يمنع استخدامه	داء المنطقه الحزام الناري Zoster

السفر واللقاحات الأخرى

التوصيات العامة لاستخدامه لدى النساء الحوامل	اللقاح
بحال التعرض لمخاطر منخفضة : لا يوصى به	الجمرة الخبيثة Anthrax
بحال التعرض لمخاطر مرتفعة : يمكن استخدامه	لقاح السل BCG
يمنع استخدامه	التهاب الدماغ الياباني Japanese Encephalitis
عدم كفاية البيانات لتوصية محددة	السحايا MPSV4
يمكن استخدامه اذا دعت الحاجة	داء الكلب Rabies
يمكن استخدامه اذا دعت الحاجة	حمى التيفوئيد Typhoid
عدم كفاية البيانات لتوصية محددة	الجدري Smallpox
قبل التعرض: يمنع استخدامه	
بعد التعرض: يوصى به	
يمكن استخدامه بحال كانت الفوائد تفوق المخاطر	الحمى الصفراء Yellow Fever